

قابيكا

(بريفاغالين)

50, 100 و 150 ملجم كبسولات

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل إستعمال أو تناول هذه الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر ، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية ، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأشخاص آخرين ، لأن ذلك قد يزددهم ، حتى وإن كانوا يعانون من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة حدة الآثار الجانبية أو الإصابة بأثر جانبى لم يتم ذكره في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ماهو قابيكا وما هي دواعي إستعماله

2. قبل القيم بتناول قابيكا

3. سامي طرقة تناول قابيكا

4. الآثار الجانبية المحتملة

5. طرفة تذكرة قابيكا

6. معلومات إضافية

1. ماهو قابيكا وما هي دواعي إستعماله

اسم دوائك هو قابيكا 50 ملجم وقابيكا 100 ملجم وقابيكا 150 ملجم وقابيكا 75 ملجم وقابيكا بقىوي على مادة بريغابالين. بريغابالين ينتهي إلى مجموعه من الأدوية المستخدمة لعلاج المصرع ، والألم الأعصاب وأضطراب القلق العام (GAD) في البالغين.

ويستخدم لعلاج الألام طويلة الأمد الناجمة عن الأضرار التي لحقت الأعصاب: الطرفية والمركيزة ، ويمكن أن يكون لها تأثير على الأداء البدني والاجتماعي ونوعية الحياة عموماً.

ويستخدم بريغابالين لعلاج شكل معين من المرض (النوبات الجزئية مع أو بدون تعميم ثانوي) في البالغين. ويستخدم كعلاج مساعد في المرض.

(GAD) ويستخدم بريغابالين لعلاج اضطراب القلق العام (GAD)

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل إستخدام قابيكا

لا تستخدم قابيكا إذا كنت تعاني من حساسية لبريفاغالين أو أي من المكونات الأخرى من هذا الدواء.

التحذيرات والاحتياطات

أفاد بعض المرضى الذين يتناولون قابيكا عن وجود أعراض رد الفعل التحسسي وتشمل هذه الأعراض تورم في الوجه والشفتين واللسان، والحنجرة، وكذلك طفح جلدي متضرر.

إذا واجهت أي من هذه التفاعلات، يجب عليك إتصال بطبيبك على الفور.

- ارتبط قابيكا بعد وضوح أو فقدان الرؤية، أو تغيرات أخرى في البصر، وكثير تقع في المرضى المسنين.

- قد يسبب قابيكا فقد إخبار طبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي تغيرات في رؤيتك.

- بعض المرضى الذين يعالون من مرض السكري والذين اكتسبوا وزناً مع استخدام بريغابالين قد يحتاجوا إلى تغيير في ادوينهم.

- المرضى الذين يعالون من عدم تحمل الفاكتورز عليهم عدم تناول قابيكا لأن بريغابالين كبسولات يحتوي على اللاكتون.

- وكانت هناك تقارير عن فشل القلب في بعض المرضى عند استخدام قابيكا، كان هؤلاء المرضى كبار السن في الغالب مع عرضوف احتلال القلب والأوردة الدموية.

قبل استخدام هذا الدواء يجب إخبار الطبيب إذا كان لديك تاريخ من مرض القلب.

- كما كانت هناك تقارير من الفشل الكلوي في بعض المرضى عند استخدام قابيكا.

- كان هناك عدد قليل من الناس يعالجون بأدوية مكافحة المصرع مثل قابيكا واجهوا أشكار بذلة أو قتل أنفسهم. إذا ظهرت لديك هذه الأفكار في أي وقت ، اتصل

طبيبك على الفور.

- عندما يؤخذ قابيكا مع الأدوية الأخرى التي قد تسبب الإمساك (مثل بعض أنواع الأدوية الآلام) فمن الممكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي على سبيل المثال آخر طبيبك إذا كنت تعاني من الإمساك، وخصوصاً إذا كنت عرضة لهذه المشكلة.

- قبل أخذ هذا الدواء يجب إخبار الطبيب إذا كان لديك تاريخ من الإدمان على الكحول أو الاعتماد على المخدرات.

- وكانت هناك تقارير عن التشتنجات عند استخدام قابيكا أو بعد فترة وجيزه من وقف قابيكا. إذا كنت تعاني من التشتنج، اتصل بطبيبك على الفور.

- وكانت هناك تقارير عن انخفاض في وظائف المخ في بعض المرضى الذين يتناولون قابيكا عندما يكون لديهم طرروف أخرى. خبر طبيبك إذا كان لديك تاريخ من أي حالات طبية خطيرة، بما في ذلك الكبد أو أمراض الكلى .

الأطفال والراهقين
لم تثبت سلامة وفعالية في الأطفال والراهقين (أقل من 18 سنة من العمر)، وبالتالي، بريغابالين لا ينبغي أن يستخدم في هذه الفئة العمرية
الأدوية الأخرى

غير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستخدم، مخراً أي أدوية أخرى.
قابيكا وبعض الأدوية الأخرى قد تؤثر على بعضها البعض (التفاعل) عندما تؤخذ مع أدوية أخرى معينة، قد يغز قابيكا الآثار الجانبية لهذه الأدوية، بما في ذلك فشل في الجهاز التنفسى والغيبوبة. ويمكن زيادة درجة الدوخة، النعاس وانخفاض التركيز إذا أخذ قابيكا جنباً إلى جنب مع المنتجات الطبية التي تحتوي على:

كودين (استخدم لعلاج الألم)

وبيازام (التي تستخدم لعلاج الفانق)

قابيكا يمكن أن تؤخذ مع وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

قابيكا مع الطعام والشراب والكحول

يمكن أن تؤخذ كبسولات قابيكا مع أو بدون الطعام.

ينصح بعدم شرب الكحول معأخذ قابيكا.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا ينبغي أن يؤخذ قابيكا خلال فترة الحمل، إلا إذا قال لك الطبيب خلاف ذلك. يجب استخدام وسائل منع حمل فعالة من قبل النساء أثناء إمكانية الإنجاب، إذا كنت حاملاً أو تتعرضين لفلك رضاعة طبيعية، أو تعتقدين أنك قد تكوني حاملاً أو تخططي لإنجاب طفل، إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

الرضاعة الطبيعية

لا ينصح ارضاعك لطفلك رضاعة طبيعية أثناء استخدام قابيكا كما من غير المعروف ما إذا كان يتم افراز بريغابالين في حليب الأم. إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام قابيكا.

القيادة واستخدام الآلات

قابيكا قد يسبب الدوخة، النعاس وانخفاض التركيز. يجب أن لا تدفع، وتعمل على الآلات المعدة أو الانحراف في أشطة خطيرة أخرى حتى تعرف ما إذا كان هذا الدواء يؤثر على قدرتك على أداء هذه الأشطة.

3. كيفية استخدام قابيكا

دائماً استخدم هذا الدواء تماماً كما وصفه لك طبيبك استشر طبيبك أو الصيدلي إذا

كنت غير متأكد.

طبيبك سوف يحدد ما الجرعة المناسبة لك. قابيكا هو للاستخدام عن طريق الفم فقط.

لعلاج الألم الأعصاب الطرفية والمركيزة.

الصرع أو اضطراب القلق العام

- خذ عدد الكبسولات كما يدهرا الطبيب

- الجرعة، والتي تم وصفها لك حسب وضعك، سوف تكون عادة ما بين 150 ملغم و 600 ملغم كل يوم.

- طبيبك سوف يقول لك أن تستخدم قابيكا إما مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. لمرين في اليوم تستخدم قابيكا مرة في الصباح ومرة في المساء، في الوقت نفسه تقريباً كل يوم. لثلاث مرات في اليوم تستخدم قابيكا مرة واحدة في الصباح، ومرة واحدة في فتره ما بعد الظهر ومرة في المساء، في الوقت نفسه تقريباً كل يوم.

- إذا كان لديك اضطراب بأن تأثير قابيكا قوي جداً أو ضعيف جداً، يجب التحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

- إذا كنت تمرض مرض من (أكثر من 65 سنة من العمر)، يمكن أن تستخدم قابيكا عادة إلا إذا كان لديك مشاكل في الكلى.

- طبيبك قد يصف جدول الجرعات المختلفة / أو جرعة إذا كان لديك مشاكل مع الكلى.

كيفية الاستعمال

يجب إبتلاع الكبسولة بالماء.

يمكن استخدام قابيكا مع أو بدون طعام.

إذا نسيت استعمال قابيكا:

من المهم استعمال قابيكا يومياً وينظم. إذا نسيت استعمال الجرعة في زمنها المحدد سارع بأخذها في أقرب وقت ما لم يكن زمن الجرعة التالية وفي هذه الحالة استمر في أخذ جرعة بصورة طبيعية ولا تضاعف الجرعة لتجنب تراكم الجرعة المنسنة

إذا كنت تستخدم قابيكا أكثر مما يجب

قد ينبع من تناول جرعة أعلى من الجرعات الموصى بها زيادة التعرض لأنثر الجانبي بما في ذلك الشعور بالدوار والغثيان والهبوط أو القيء. إذا كنت تتناول قابيكا أكثر مما وصفه لك الطبيب في الاتصال بالطبيب أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفي على الفور واصطحب معك أي من الكبسولات المتبقية مع العبوة والملصق حتى يتمكن الطبيب بسهولة معرفة الدواء الذي تم تناوله

إذا توقفت عن تناول قابيكا

لا توقف عن أخذ قابيكا ما لم يخبرك طبيبك. إذا تم إيقاف العلاج يجب أن يتم ذلك تدريجياً على مدى لا يقل عن الأسبوع

بعد وقف العلاج بقابيكا لفترة طويلة أو قصيرة الأجل، تحتاج إلى معرفة الاعراض التي قد تواجهك مثل بعض الآثار الجانبية وتشمل هذه الأعراض الشعور، والصداع، والغثيان، والإكتئاب، والآلام، التعرق، والدوار ، واضطرابات النوم، والصداع، والغثيان،

والشعور بالدوار والآهال والانفلونزا

قد تحدث أكثر شعراً أو بشدة إذا كنت قد استخدمت قابيكا لفترة أطول من الزمن

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي

