

قابكس

(جابابتين)

100 ملجم كبسولات 300، 400

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذه الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، قم بزيارة الطبيب أو الصيدلاني.

- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأشخاص آخرين ، لأن ذلك قد يؤذيهم ، حتى وإن كانوا يعانون من نفس الأعراض التي سبق وأن عانت منها

قم بالإتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلاني في حال زيادة حدة الآثار الجانبية أو الإصابة بأثر جانبى لم يتم ذكره في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

- ما هو قابكس وما هي دواعي استعماله
- قبل القيام بتناول قابكس
- ما هي طريقة تناول قابكس
- الآثار الجانبية المحتملة
- ظروف تحذير قابكس
- معلومات إضافية

1. ما هو قابكس وما هي دواعي استعماله

اسم دوanke هو قابكس 100 ملجم أو 300 ملجم أو 400 ملجم كبسولات ينتمي

قابل إلى مجموعة من الأدوية تستعمل للحالات التالية:

- لعلاج الصداع

- لتخفيف الألم طويلاً الأمد الناتج عن تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي الطرفي)

لعلاج المصروع: يستعمل قابكس لعلاج الأشكال المختلفة من الصداع عند البالغين والأطفال

فوق 6 أعوام.

صياغة ذلك الطبيب قابكس إذا لم يجد علاج الحالى يسيطر على الصداع لديك بشكل كاف.

يجب أن تتناول قابكس بالإضافة إلى علاج الحالى.

من الممكن أن يقرر الطبيب استعمال قابكس لوحده أيضاً وذلك اعتماداً على حالة المريض.

لتخفيف الألم الناتج عن الاعتلال العصبي الطرفي:

الألم الناتج عن الاعتلال العصبي الطرفي هو الألم طويلاً الأمد ناتج عن تلف الأعصاب . قد

يسبب العديد من الأمراض المختلفة هذا النوع من الألم (يحدث بشكل رئيسي في الساقين /

أو الذراعين) مثل إدراك السكري (ارتفاع مستوي سكر الدم) أو الحال الطيفي (مرض يسببه

فيروس فاريسيلا). من الممكن الشعور بالألم كارتفاع في درجة حرارة الجسم، حرقة،

حرقان، ألم حاد بدني في مكان واحد وسرعان ما ينتقل إلى أماكن أخرى ، أو كالم الناتج في

الظهر حالاً ، ألم حاد، مقص ، ألم مستمر، الشعور بوخر خفيف، تتمدد، تشوش الحس

التي يستعمل قابكس لعلاج هذه الألام طويلاً الأمد.

2. قبل استخدام قابكس

يجب عدم تناول قابكس إذا كنت تعاني من حساسية لقابكس أو أي من المكونات الأخرى

قابل إلىه في استخدام قابكس آخر طبيبك إذا كنت تعاني من أنواع مختلفة من نوبات

الصرع بما في ذلك الغيب.

- هناك عدد قليل من الناس يعالجون بمضادات الصداع مثل قابكس لديهم أنكار بالياد

أو انفاسهم، إذا في أي وقت لديك هذه الأفكار اتصل طبيبك على الفور

- هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يتناولون قابكس لهم قابلية لتفاعلات تحسسية

أو تفاعلات حادة قوية وقد تتطور لامفاضل طفيرة إذا لم ت تعالج بحاجة إلى معرفة هذه

- المرضى الذين يتناولون قابكس يجب التوقف عن استخدامه إذا ظهرت عليهم

علامات التهاب البنكرياس الحادة

- الأطفال المصابين بالصرع ويستخدمون قابكس قد تتتطور عليهم تفاعلات الجهاز

العصبي السباتية من خفيفة إلى متعددة

- اختبارات البول

كبسولات قابكس قد تتدافق مع اختبارات البول. إذا كنت تحتاج إلى اختبار البول يجب

أن تغير طبيبك أو المستشفى ألاك تستعمل كبسولات قابكس

الرجاء إيجار طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخراً أدوية أخرى بما فيها

ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية.

وبالعكس:

إذا كنت تتناول قابكس على المورفين

أو مورفين قد يزيد من تأثيراته على المورفين ، الرجاء إيجار طبيبك أو الصيدلاني حيث

مكونات المجموعة التي تستعمل لعلاج عسر الهضم:

إذا تم تناول قابكس ومكونات المجموعة على الألومونيوم والمغنيسيوم في نفس

الوقت قد يقلل امتصاص قابكس بما في ذلك قابكس بعد ساعتين من تناول

مضاد المجموعة.

إذا استخدمت هذه الأدوية يجب مرافقه علامات الكآبة الناتجة من الجهاز العصبي المركزي

قابل من غير المتوقع أن يتفاعل مع الأدوية الأخرى المضادة للصرع أو أقراص منع

الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم.

- تناول قابكس مع الطعام والشراب

من الممكن تناول قابكس مع أو دون تناول الطعام

يجب تجنب تناول قابكس خلال فترة الحمل ، مالم يخبرك الطبيب بغير ذلك يجب على

النساء في سن الإنجاب استعمال مانع حمل فعال.

لا يوجد دراسات تتعلق بشكل خاص بتناول جابابتين للنساء الحوامل ، لكن تم تسجيل

زيادة خطير لعرض الجنين للخطر عند استعمال أدوية أخرى المضادة للصرع وبوتاسيات الصدر

خصوصاً عن استعمال أكثر من نوع لعلاج نوبات الصدر خلال فترة الحمل و فقط تحت

إشراف الطبيب أخير طبيبك على الفور إذا حصل الحمل أو كنت تعانين بذلك حامل أو

أعراض جانبية:

قد تخرج عن تناول قابكس لأن تأثيره على المريض غير معروف.

استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

قيادة المركبات واستخدام الآلات

قد يسبب قابكس الشعور بالدوار، النعاس والتعب يجب تجنبقيادة أو تشغيل الآلات المعدنة أو المشاركة في أي نشاطات أخرى غير معمول أن تكون خطيرة حتى تعرف كيفية تأثير هذا الدواء على قدرتك القيام بهذه الأنشطة.

القيادة وإدارة المركبات:

قد ينتزع عن استخدام قابكس تماماً لأن المادفعها

استخدام المركبات أو المشاركة في الأنشطة الخطرة حتى التأكيد ومعرفة ما إذا كان هذا الدواء يؤثر في القراءة على اداء هذه الأنشطة.

3. ما هي طريقة تناول قابكس:

دائماً تتناول قابكس تماماً كما يخبرك الطبيب يجب عليك التأكيد من طبيبك أو

الصيدلاني إذا لم تكن متاكداً

وعادة ما يؤخذ Gabix ثلاث مرات يومياً (في الصباح وبعد الظهر ومساء).

طبيبك سوف يحدد لك ما هي الجرعة المناسبة لك إذا كنت أحد كبار السن (أكثر من 65 سنة)، أو تعاني من مرض في الكلى أو

إنك تقوم بغيسل الكلى يعني أن تأخذ كبسولات GABIX على التوقيع الذي يحدده الطبيب.

الجرعة:

سيحدد طبيبك الجرعة المناسبة لك

إذا كنت تتناول قابكس تماماً كما ي吩咐 طبيبك عن تناول قابكس عن الإعتلال العصبي الطرفي:

تناول عدد كبسولات حسب تعليمات الطبيب

سيقوم الطبيب بريادة عن ذلك تدريجياً

بعد ذلك قد يتم زيادة الجرعة تدريجياً كحد أقصى إلى 3600 ملجم يومياً.

سيخبرك الطبيب بتناولها على 3 جرعات مفصلة، أي واحدة في الصباح ، واحدة وفقط

وتحتاج إلى تناول قابكس لعلاج المصاعم.

إذا كنت تتناول قابكس لعلاج المصاعم لديك:

البالغون والمرأهون فوق 12 عاماً:

تناول عدد كبسولات حسب طبيبك كما وصفه

سيقوم الطبيب بريادة عن ذلك تدريجياً

بعد ذلك قد يتم زيادة الجرعة تدريجياً كحد أقصى إلى 3000 ملجم و 900 ملجم يومياً.

بعد ذلك قد يتم زيادة الجرعة تدريجياً كحد أقصى إلى 3600 كجم يومياً.سيخبرك

الطبيب بتناولها على 3 جرعات مفصلة، أي واحدة في الصباح ، واحدة وفقط

وتحتاج إلى تناول قابكس لعلاج المصاعم.

الأطفال الذين يبلغون عن 6 سنوات فما فوق:

سيتم تحديد الجرعة من المرضي

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو التقدم في

العين أو مرض ما (قد يصفه لك الطبيب نظام جرعة و/ أو جرعة مختلطة).

إذا كنت كبار السن (فوق 65 عاماً) يجب تناول قابكس كما هو موصوف (ما

لم تكن تعاني من مشاكل في الكلى)

طريقة الاستعمال

دائماً تناول كبسولات مع كمية كافية من الماء.

مدة الملاج:

استشيري في تناول قابكس حتى يخبرك الطبيب بالتوقف لا تتوارد هذا

الدواء دون استثناء الطبيب

إذا تناولت قابكس أكثر مما يجب

قد ينتزع عن تناول جرعات أعلى من الجرعة الموصى بها زيادة التعرض للأثار

الجانبية بما في ذلك فقدان الوعي الشعور بالدوار، ازدواجية الرؤيا، تعلق الكلام ،

الشعور بالتعاس وأسفل. إذا قمت بتناول قابكس أكثر مما وصفه لك الطبيب قد

بالاتصال بالطبيب أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى على الفور

واصطحب معك أي من كبسولات المبنية مع العبوة والملاصق حتى يتمكن

الطبيب بمسؤولية معرفة الدواء الذي تم تناوله.

إذا ثبتت تناول جرعة قابكس

إذا ثبتت تناول جرعة تناولها حال تذكرك، لام يحن موعد الجرعة التالية لا

تناول جرعة مضافه لتعويض الجرعة التي نسيتها.

- أثار جانبية تتبع التوقف المفاجئ عن تناول جابينتين (قلق ، صعوبة القدرة على النوم، غثيان ، آلم ، تعرق، آلم في الصدر).
- اضطراب مستمر الطوكيوز في الدم عند المرضى الذين يعانون من داء السكري إذا أزدادت حدة أي من الأثار الجانبية أو إذا لاحظت لأي أثار جانبية أخرى غير مذكورة في هذه النشرة ، الرجاء إيجار طبيك أو الصيدلاني.

- 5. ظروف تغرين قابس**
يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.
لا يستخدم قابس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
لا تغرن الطيور في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
احتياطات خاصة عند الانتهاء من استعمال المستحضر
- يجب عدم التخلص من أي أدوية عن طريق رميها في المياه العادمة أو النفايات المنزلية، استشير الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعد تستخدمها.
- سوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة

6. معلومات إضافية

وصف المنتج

كبسولات

مذا يحتوي قابس :

قابس 100 ملجم ، تحتوي كل كبسولة على:
جابينتين (ستور الأدوية الأمريكية) 100 ملجم
قابس 300 ملجم ، تحتوي كل كبسولة على:
جابينتين (ستور الأدوية الأمريكية) 300 ملجم
قابس 400 ملجم تحتوي كل كبسولة على:
جابينتين (ستور الأدوية الأمريكية) 400 ملجم

السواغات: مايكرو كريستاليان سيليوز ، كوليidal ان هايدرس سيليكا
وماقنزيزم استيريت
عبوة تحتوي على 10 كبسولة

رقم التسجيل بالسودان :
كبسول قابس 100 ملجم : CP/04/3802
كبسول قابس 300 ملجم : CP/04/3803
كبسول قابس 400 ملجم : CP/04/3801

الشركة المصنعة

فائز فارما
كراتشي 7 - 47900 - باكستان
+92 2111111511
+922135057592
ایمیل: info@getzpharma.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالوكيل في السودان
شركة التومة فارما المحدودة
الخرطوم بحري - الصبابي شلال مربع 4 عمارة المنى رقم 3 الطابق الثاني
تلفون: +24912072064
وتمت الموافقة على هذه النشرة 30/9/2015

للقيام بالإبلاغ عن أي من الأعراض الجانبية
المجلس القومي للأدوية والسموم
فابن: (+249) 183 522263
البريد الإلكتروني: info@nmpb.gov.sd
الموقع الإلكتروني: www.nmpb.gov.sd

- ان هذا دواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً
للتوصيات عرضتك الخطأ
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الدواء وتعليمات
الصيدلاني الذي صرفة لك
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من ققاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادة العرب

إذا توقفت عن تناول مرعة قابس
يتم بالتدريج خلال أسبوع على الأقل إذا توقفت عن تناول قابس فجأة أو قبل أن
يغيرك الطبيب بذلك قد يزداد مطر التعرض لنوبات الصرع.
إذا كان لديك أسلحة أضافية عن إستعمال هذا الدواء أسل طبيك أو الصيدلاني
مثل كل الأدوية قد يسبب قابس أثاراً جانبية على الرغم من عدم حدوثها لدى

الجميع.
قم بالاتصال مع طبيك على الفور إذا حصل لديك أي من الأعراض التالية بعد
تناول هذا الدواء حيث قد تكون خطيرة
تفاعلات جانبية حالة التي تناول إلى عناية فورية ، توقي الشفاه والوجه طفح
جلدي وأحمرار وأو فقدان الشعور (قد تكون هذه أعراض لتفاعل تحسسيا خطير).
قد يستمر في المدة الشعور بالغثيان والقي حيث قد تكون هذه أعراض لإنتهاه
حاد في النكرايس.

قد يسبب قابس تفاعل تحسسيا خطير أو مهدد للحياة الذي قد يؤثر على الجلد أو
أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو خلايا الدم من الممكن أن تعاني أو قد لا
ادخاله للمستشفى أو التوقف عن تناول قابس قام بالاتصال بطبيك
على الفور إذا حصل لديك أي من الأعراض التالية:

- طفح جلدي
- شرى
- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- تورم مستمر في الخد
- تورم النفحة والسان
- إصفرار الجلد أو المنطقة البيضاء في العيون
- التعرض للبرد أو الريح أو الرياح على غير المعتاد
- الشعور بالتعب أو الصعف الحاد
- ألم غير مزبور في العضلات
- التهابات متكررة

قد تكون هذه أعراض أول علامات لحدث تفاعل خطير يجب على الطبيب
فحصك بغير إذا كان من الصعب الاستمرار بتناول قابس. إذا كنت تشك
الدليلة الدموية ، أخبر طبيك إذا حصل لديك الـ M و/أو ضعف في العضلات
أثار جانبية أخرى تتضمن:
أثار جانبية شائعة جداً (التي قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من كل 10
أشخاص)

- التهاب فيروسي
- الشعور بالغثيان ، الدوار ، فقدان التنسق
- الشعور بالتعب (ارتفاع درجة حرارة الجسم)
أثار جانبية شائعة (التي قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من كل 100 شخص)
- التهاب رئوي ، التهابات تنفسية ، التهابات الجهاز البولي التهاب الأذن أو
أنيفاس آخرى
- الشفاه والوجه زرادة الشفيفه .
- الغصب إتجاه الآخرين ، الإرثراك تغيرات في المزاج ، أكتئاب ، قلق ،
عصبية ، صعوبة في القدرة على النوم ، صداع ، حساسية الجلد
فقدان الحس (تنعل) صعوبة في التنفس ، حركة غير طبيعية في العيون ، زيادة
انخفاض أو غياب ريد الأفال ،
- ضبابية إزدواجية الرؤية

- رنح
- ارتفاع ضغط الدم ، أحمرار الوجه أو توسيع الأوعية الدموية .
- صعوبة في التنفس ، التهاب القصبات التهاب الحلق معال جفاف الأنف .
- في غثيان ، مشاكل في الأسان ، التهاب اللثة ، إسهال الدم في المعدة ، عسر هضم ،
آمسال ، جفاف المم أو البلغم ، تفاص الطين .
- تورم الوجه ، التعرض الكلمات طفح ، حكة ، جب الشباب
- ألم في المفاصل ، ألم في العضلات ، ألم في الظهر ، فضنان
- صعوبة في الانتصاب (عنة)
- تورم الساقين والذراعين ، صعوبة في المشي ، ضعف ، آلم ، شعور بالتعب ،

أعراض تشنثه الإنفلونزا
- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء ، انخفاض الوزن إصبات مفاجئة ، كسور ،
كتشوط
- بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل حالات من التصرف العدوانى والحركتات غير المترابطة
 بشكل شائع في الدراسات السريرية على الأطفال .
أثار جانبية غير شائعة (التي تؤثر على أكثر من شخص واحد كل 1000 شخص):

- تفاعلات تحسسية مثل الشرى
- قلة الحركة
- نصبات قلب سريعة
- التورم الذي يشمل الوجه ، الجدع والأطراف .

نتائج فحص دم غير طبيعية التي تدل على وجود مشاكل في الكبد .
تم تسجيل الآثار الجانبية التالية منذ عرض الدواء في السوق:

- انخفاض الصفيحات الدموية (خلايا تحضر الدم)
- هلوسات
- مشاكل الحرکات غير الطبيعية مثل الإنلوات ، الحركات غير المترابطة
والتبني .
- رنين في الأذن

- مجموعة من الآثار الجانبية تحدث معاً والتي تتضمن تورم العقد الليمفاوية
(كل منها صفرة مرتفعة تحت سطح الجلد) ارتفاع درجة حرارة الجسم .
طفح والتهاب الكبد .

- إصفرار الجلد والمنطقة البيضاء في العيون (يرقات) التهاب الكبد .

- قصور حاد في وظيفة الكلى ، سلس بول

- زيادة انسجة الذهني ، تضخم الذهني .