

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالوكيل في السودان:
شركة الدولة فارما المحدودة
الخرطوم بحري - الصيادي شمال مربع 4 مبني المني رقم 3 الطابق الثاني
الهاتف: +249120762064

للقىام بالإبلاغ عن أي من الأعراض الجانبية
المجلس القومى للأدوية والسموم
فاكس: 183 522263 (+249)
البريد الإلكتروني : info@nmpb.gov.sd
الموقع الإلكتروني : www.nmpb.gov.sd

9. تاريخ إعداد النشرة
30 سبتمبر 2015

ان هذا الدواء
- الدواء مستحضر طبى يؤثر على صحتك و استخدامه خلافاً للتعليمات
يرضاك للخط.
- أتبع دقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و
تعليمات الصيدلاني الذى صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبراء بمنافع و مخاطر الأدوية.
- لاقطع مدة العلاج المحددة من تقاء نفسك
احتفظ بجميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب
وأتحاد الصيادلة العرب

4. تحذيرات أثناء الاستخدام
أشياء يجب عليك الارتعاشها
يجب ان تعلم ان إيقاف او عدم انتظام تعاطي الدواء قد ينتج عنه عدم خفض مستوى السكر او قد يؤدي الى سوء الحالة. لا يجب التوقف عن استعمال الدواء من تقاء نفسك الا إذا أخبرك الطبيب بالتوقف عن استعمال قتربيل.

في حالة العمل أو الرضاعة الطبيعية:
لا ينبغي استعمال قتربيل خلال فترة العمل. أخبر طبيبك إذا كنت، أو تعتقدين أنه قد تكوني أو تخططي لتصبحي حاملاً.
قد ينفع الدواء إلى حليب الثدي. لذا لا ينبغي أن يستخدم قتربيل أثناء الرضاعة الطبيعية.
إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المعلومة قبل استعمال أي دواء.

القيادة و استخدام الآلات الثقيلة:
قد تقتل قدرتك على الترکيز أو في ريدود الفعل إذا حدث إنتفاخ أو ارتفاع في نسبة السكر في الدم أو تعياني من الرؤية نتيجة لهذه الحالات. يجب ان تعي انه قد تشكل خطورة على نفسك وعلى الآخرين عند قيادة سيارة أو تسيير الآلات. يرجى ان تتطلب مشرورة طبيبك ما إذا كان يمكنك قيادة سيارة إذا كان لديك ثوابت متكررة من نفس سكر الدم أو قليل من التوابت من غير إشارات مسيبة.

5. الآثار الجانبية المحتملة
أخبر طبيبك فوراً إذا تواجه أي من الأعراض التالية:

- الحساسية (بما في ذلك التهاب الأوعية الدموية، وغالباً مع طفح جلدي) والتي قد يصاحبها صعوبة في التنفس، وانفاسات الكبد بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين (البركان)، ومشكلة في تدفق الصمار الصفراء والتئاب الكبد او قتل الكبد.
- حساسية الجلد مثل الحكة والطفح وخلايا التحل وزيادة الحساسية للشمس. بعض اعراض الحساسية الخفيفة قد تتطور الى اعراض خطيرة.
- اعراض نفس سكر الدم بما في ذلك فقدان الوعي.

الآثار الجانبية الأخرى وتشمل:
- حساسية الجلد مثل الحكة والطفح وخلايا التحل وزيادة الحساسية للشمس. بعض اعراض الحساسية الخفيفة قد تتطور الى اعراض خطيرة مثل صعوبة النשימה والتنفس وضيق التنفس والسان والحلق. وفي حالة ظهور اي من هذه الاعراض يجب اخطار طبيبك فوراً
- قد تحدث التحسس القاتلي مع السلفونوريا، السلفوناميد او الادوية المرتبطة به
- قد توجد مشكلات في الرؤية مع بدأها استعمال قتربيل نتيجة للتغير في مستوى السكر في الدم وهذه الاعراض يمكن ان تتحسن سريعاً
- زيادة إنزيمات الكبد
- تزيف غير عادي او كدمات شديدة تحت الجلد.

طريقة التخزين:

- لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من 30°C.
- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

6. كيفية التخلص من الدواء التاليف:

يجب أن لا يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.
أسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. سوف تساعد هذه التدابير حماية البيئة.

7. معلومات إضافية
وصف المنتج

- أقراص قتربيل 3 ملغ باللون الأزرق الفاتح على شكل قرص مستطيل، محفور عليها
كلمة "GETZ" على جانب واحد و مقسمة بخط في المنتصف من الجانب الآخر.
- أقراص قتربيل 4 ملغ وردية اللون، على شكل مستطيل، محفور عليها كلمة "GETZ"
من الجانب واحد و مقسمة بخط في المنتصف الآخر.

المكونات:
المادة الفاعلة: Glimepiride

المكونات الفاعلة:
- أقراص قتربيل 3 ملغ: اللاكتوز، كيربيات لوريل الصوديوم، محفور علىها رقم Avicel PH (خليوز)، على كل لات نشاء الصوديوم، المغببديوم الإستارات، لون الأزرق
- أقراص قتربيل 4 ملغ: اللاكتوز، كيربيات لوريل الصوديوم، لون وردي رقم Avicel PH (خليوز)، على كل لات نشاء الصوديوم، المغببديوم الإستارات، لون وردي

رقم التسجيل بالسودان:
أقراص قتربيل 3 ملغ: اجنة رقم 240/2014
أقراص قتربيل 4 ملغ: TB /06/3861

8. الشركة المصنعة

فيتر فارما
74900 كراتشي - باكستان
27 \ 30-29 المنظمة الصناعية - كورانقى
تلفون: +92 2111111511
فاكس: +92 2135057592
ايميل: info@getzpharma.com